

2014.06.01-7 山形市野草園

## 山形市野草園

この野草園は、市制100周年記念事業の一つとして設置されたものです。豊かな自然のなかで、「自然のしくみ」や「緑の大切さ」など、自然と人間とのかかわりを学ぶことをねらいとしています。

蔵王山系に自生する野草や樹木をはじめ、四季おりおりの野鳥や昆虫なども観察することができます。

開園 平成5年  
面積 26.5ha

### YAMAGATASHI YASOEN

YAMAGATASHI YASOEN was established to commemorate the centennial anniversary of Yamagata City. It was founded with the intention of providing opportunities to learn more about the relationship that exists between nature and human beings. In addition, observers can experience the features of nature as well as the importance of flowers and plants in an abundant nature setting.

Wild plants and trees, which grow around the Zao Mountain Range, as well as various kinds of birds and insects can be observed during all four seasons.

Established 1993  
Area 26.5 hectare





## タニウツギ（スイカズラ科）

北海道、本州の主に日本海側の山地に生え、高さ2～5mになる落葉低木です。葉は対生し、楕円形で、先は鋭くとがります。葉腋から散房花序を出し、花を2～3個ずつつけます。花冠は漏斗形です。

〔花期〕 5～6月

〔花の色〕 淡紅色

〔和名〕 谷間に多く生えることからこの名がつけました。







タニウツギ（谷空木）スイカズラ科





サラサドウダン(更紗灯台)ツツジ科 落葉低木  
別名:フウリンツツジ(風鈴躑躅)







## オゼコウホネ（スイレン科）

尾瀬ヶ原、月山、北海道猿仏原野の沼地に自生する多年生の水草です。根茎は太く、泥の中をはいます。沈水葉は短い柄があり、長卵形です。他の葉は非常に長い1～3mの葉柄があり、葉身は水面に浮かびます。萼片は5枚で花びらのように見えます。柱頭は盤状で深紅色です。野草園のオゼコウホネは他の生育地よりも生長が盛んです。

【花期】 6～8月（野草園）

【花の色】 黄色







オゼコウホネ(尾瀬河骨)スイレン科



# サクラソウ (サクラソウ科)

北海道南部、本州、九州の山地や河畔の草原に生える多年草です。葉は根元に多数集まり、楕円形で縁は浅く切れ込みます。全体に毛が多いです。花冠の上部は深く5つに裂け、裂片はさらに浅く2つに裂けます。

〔花期〕 4～5月

〔花の色〕 紅紫色

〔和名〕 花の形が桜に似ていることから、桜草という名になりました。







クリンソウ(九輪草)サクラソウ科





# ヒョウタンボク(すいかずら科) 【有毒植物】

北海道から本州、四国に分布し、山地に生えるほか、観賞のため栽培される落葉低木。樹高は約1.0m~1.5m。花期は4~6月。枝上部の葉脈から2花を並べて開く。はじめ白色、のちに黄色に変わる。液果は球状で赤く熟し、2個が接着してひょうたん状になる。

〔有毒部分〕 主として果実

〔有毒成分と症状〕 果実にイリドイド化合物を含み、果実により小児の中毒症状として嘔吐、下痢、痙攣、昏睡などを起こすことが報告されている。

〔その他〕 ヒョウタンボクの和名は果実の形に由来する。キンギンボクは花の色が白と黄が入り混じる様子を銀と金にたとえたもの。

(別名:キンギンボク)







ヒョウタンボク（瓢箪木）スイカズラ科 落葉低木  
別名：キンギンボク（金銀木）





オサバグサ(箴葉草)ケマンソウ科





アモ

いり





アカモノ(赤物)ツツジ科 常緑小低木





クマガイソウ(熊谷草)ラン科





アツモリソウ（敦盛草）ラン科