

2017.02.07

福岡市西区・今津干潟のチョウゲンボウ、ウミアイサ



ウミアイサ (海秋沙) ガンカモ科 L=55cm









ツクシガモ（筑紫鴨） ガンカモ科 L=63cm



ツクシガモ（筑紫鴨） ガンカモ科 L=63cm



ツクシガモ (筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm



ツクシガモ (筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm



チョウゲンボウ（長元坊）
ハヤブサ科 L=メス39cm



チョウゲンボウ（長元坊）
ハヤブサ科 L=メス39cm



チョウゲンボウ（長元坊）
ハヤブサ科 L=メス39cm



ミサゴ (鵟) ワシタカ科 L=メス64cm



カワウ（河鵜） ウ科 L=82cm

A blue-winged sandpiper (蒼脚鷗) is shown in profile, facing left, foraging in shallow, rippling water. The bird has a long, straight, dark bill and is captured in the act of picking up a small, dark object from the water. Its plumage is a mix of brown and white, with a distinct pattern on the wings. The background consists of gentle, undulating waves of the sea.

アオアシシギ (蒼脚鷗) シギ科 L=35cm



↑
マガン (真雁)
ガンカモ科 L=72cm

ヒシクイ (菱喰) ガンカモ科 L=85cm



↑
マガン (真雁)
ガンカモ科 L=72cm

ヒシクイ (菱喰) ガンカモ科 L=85cm



↑
マガン (真雁)
ガンカモ科 L=72cm

ヒシクイ (菱喰) ガンカモ科 L=85cm



ウミアイサ（海秋沙） ガンカモ科 L=55cm





メス



オス

ウミアイサ (海秋沙) ガンカモ科 L=55cm



ウミアイサ（海秋沙） ガンカモ科 L=55cm



ウミアイサ (海秋沙) オス
ガンカモ科 L=55cm



ウミアイサ (海秋沙) オス
ガンカモ科 L=55cm



ウミアイサ (海秋沙) オス
ガンカモ科 L=55cm

END