

2017.03.07

福岡市西区・今津干潟のヘラサギ、ウミアイサ、コブハクチョウ



毘沙門山（びしゃもんやま）177m



ヘラサギ(白鷺)
トキ科 L=86cm



コブハクチョウ(瘤白鳥) ガンカモ科 L=152cm



ヘラサギ (篋鷺)
トキ科 L=86cm




ヘラサギ（篋鷺） トキ科 L=86cm





ハマシギ (滨鹬)
シギ科 L=21cm



ハマシギ (滨鹬)
シギ科 L=21cm



カワウ（河鵜） ウ科 L=82cm



カワウ (河鵜) ウ科 L=82cm

アオサギ (蒼鷺) サギ科 L=93cm



アオサギ（蒼鷺） サギ科 L=93cm



ツクシガモ (筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm

ユリカモメ (百合鷗) カモメ科 L=40cm



A photograph of three mallards swimming in a body of water. The ducks are positioned in the middle ground, with their heads and backs visible above the water. They have characteristic green heads, yellow bills, and brown bodies with black and white wing patterns. The water is dark and rippled.

マガモ (真鴨) ガンカモ科 L=59cm




カルガモ（軽鴨） ガンカモ科 L=61cm



ウミアイサ (海秋沙) オス
ガンカモ科 L=55cm



ウミアイサ（海秋沙）メス ガンカモ科 L = 55 cm



ウミアイサ (海秋沙) ガンカモ科 L=55cm



メス



オス

ウミアイサ (海秋沙) ガンカモ科 L=55cm

ウミアイサ (海秋沙) オス
ガンカモ科 L = 55 cm





ホオジロ（頬白）　ホオジロ科　L=16cm

Two Little Grebes are swimming in a body of water. They have brown and white plumage and a distinctive yellow patch around their eyes. The water is rippled, and the birds are positioned one in front of the other, both facing right.

カイツブリ (鳩)
カイツブリ科 L=26cm

A small waterfowl, possibly a grebe, is shown swimming in a body of water. The bird has a dark brown head and neck, a yellowish eye, and a dark beak. Its body is covered in brown and white feathers. The water is rippled, and the bird's reflection is visible in the water below it.

カイツブリ (鳩) カイツブリ科 L=26cm



コブハクチョウ（瘤白鳥） ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ（瘤白鳥） ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ（瘤白鳥） ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ（瘤白鳥） ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ（瘤白鳥） ガンカモ科 L=152cm

タシギ (田鵜) シギ科 L=26cm





ハシビロガモ（嘴広鴨）メス ガンカモ科 L=50cm



コガモ（小鴨）メス ガンカモ科 L=38cm







能古島 (のこのしま)



能古島（のこのしま）



E N D