

2017.03.14

福岡市西区・今津干潟の
コブハクチョウ、アカハジロ




コブハクチョウ（瘤白鳥） ガンカモ科 L=152cm



アカハジロ（赤羽白）オス
ガンカモ科 L=45cm




三角池と毘沙門山（びしゃもんやま）177m



コブハクチョウ (瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ (瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm




ヘラサギ (篋鷺)
トキ科 L=86cm

カルガモ (軽鴨)
ガンカモ科 L=61cm

クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm

ヘラサギ (篋鷺)
トキ科 L=86cm





アオサギ (蒼鷺)
サギ科 L=93cm


コサギ (小鷺)
サギ科 L=61cm

ヘラサギ (篋鷺) トキ科 L=86cm




カルガモ (軽鴨)
ガンカモ科 L=61cm

クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm


ヘラサギ (篋鷺)
トキ科 L=86cm

A group of ducks is swimming in a pond. The background is filled with tall, dry reeds. The ducks have various plumages, including reddish-brown heads and white bodies with black wings. One duck in the center has a black head with a yellow patch around its eye.

キンクロハジロ（金黒羽白）
ガンカモ科 L=40cm

ホシハジロ（星羽白） ガンカモ科 L=45cm



A group of ducks is swimming in a pond. In the foreground, a male Star-winged Duck (Hoshihajiro) with a black head and reddish-brown body is swimming towards the left. Behind it, a male Red-winged Duck (Akahajiro) with a reddish-brown head and white body is swimming. In the background, another duck is visible. In the lower right, a female Star-winged Duck (Hoshihajiro) with a reddish-brown head and greyish-brown body is swimming. The water is dark and rippled, and the background is filled with dry, brown reeds.

ホシハジロ (星羽白) オス
ガンカモ科 L=45cm

アカハジロ (赤羽白) オス
ガンカモ科 L=45cm

ホシハジロ (星羽白) メス
ガンカモ科 L=45cm



ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm



ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm



ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm



ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm



オオイヌノフグリ (大犬の陰囊)
ゴマノハグサ科



ホトケノザ

オオイヌノフグリ



ホトケノザ (仏の座)
シソ科



ホトケノザ (仏の座)
シソ科