

2017.11.06

福岡市西区・今津干潟のハマシギ、タゲリ、ヘラサギ



タゲリ (田鳧)
チドリ科 L=32cm



ヘラサギ (鳧)
トキ科 L=86cm

毘沙門山 (びしゃもんやま) 177m

浜崎山 (はまさきやま) 97m



ハマシギ (鳧)
チドリ科 L=20cm



マガモ（真鴨）メス
ガンカモ科 L=59cm



イツシギ（磯鷗） シギ科 L=20cm

A large group of white egrets, likely Black-faced Egrets and Great Egrets, are gathered in a shallow, muddy area with sparse vegetation. The birds are mostly white with long necks and long legs. Some have dark markings on their faces. They are standing in a line or small groups, facing various directions. The background shows a body of water with gentle waves.

クロツラヘラサギ（黒面篋鷺） トキ科 L=77cm

ヘラサギ（篋鷺） トキ科 L=86cm



ハマシギ(浜鵜) シギ科 L=21cm



ヘラサギ(簀懸) トキ科 L=85cm



ハマシギ(浜鵜) シギ科 L=21cm



ハマシギ(浜鵜) シギ科 L=21cm



タゲリ (田鳧) チドリ科 L=32cm



タゲリ (田鳧)
チドリ科 L=32cm



タゲリ (田鳧) チドリ科 L=32cm



タゲリ（田鳧） チドリ科 L=32cm



マガモ（真鴨） ガンカモ科 L=59cm



コサギ（小鷺） サギ科 L=61cm

A photograph of three Hamashigi (滨鹬) birds on a beach at low tide. The birds are standing on a wet, sandy surface with small puddles of water. The background is a calm, light blue sea under a clear sky. The birds have a mottled pattern of brown and white on their upperparts and a lighter, more uniform color on their underparts. They have long, thin legs and a long, straight bill. One bird is on the left, facing away from the camera. Two birds are on the right, one standing and one slightly behind it, both facing towards the camera. The water is shallow and reflects the light from the sky.

ハマシギ（浜鹬） シギ科 L=21cm



ヘラサギ（篋鷺） トキ科 L=86cm



ヘラサギ（篋鷺）
トキ科 L=86cm



クロツラヘラサギ（黒面篋鷺）
トキ科 L=77cm



ヘラサギ（篋鷺） トキ科 L=86cm



ハマニンドウ（浜忍冬）
スイカズラ科
半常緑性のつる性木本



毘沙門山（びしゃもんやま）177m



毘沙門山（びしゃもんやま）177m



毘沙門山（びしゃもんやま）177m

END