


2017.11.25

福岡市西区・今津干潟の

コブハクチョウ、チョウゲンボウ、タカサゴモズ





コブハクチヨウ (瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm




コブハクチョウ (瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ (瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ (瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm



カワラヒワ (河原鶺鴒)
アトリ科 L=14.5cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス33cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス33cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス33cm



アオサギ（蒼鷺） サギ科 L=93cm



日本沖手 (新機)
沖手料 1=2300m



コサギ (小鷺)
サギ科 L=61cm

ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm




タカサゴモズ (高砂百舌)
モズ科 L=25cm




タカサゴモズ (高砂百舌)
モズ科 L=25cm




タカサゴモズ (高砂百舌)
モズ科 L=25cm



モズ (百舌)
モズ科 L=18cm



モズ (百舌)
モズ科 L=18cm



モズ (百舌)
モズ科 L=18cm



カワウ（河鵜）
ウ科 L=82cm



ミサゴ (鵟)
ワシタカ科
L=メス64cm



ミサゴ (鵟)
ワシタカ科 L=メス64cm



ミサゴ（鵟） ワシタカ科
L=メス64cm





タゲリ（田鳧）
チドリ科 L=32cm

A bird with a long, dark crest and a white breast is standing on a sandy beach. The bird has a black and white patterned head and neck, and a white breast. It is standing on a sandy beach near a puddle. The bird's reflection is visible in the water.

タゲリ (田鳧)
チドリ科 L=32cm

END