

2018.01.25

福岡市西区・今津干潟のハチジョウツグミ、コブハクチョウ





オオバン(大鵞)
クイナ科 L=39cm




オオバン(大鵜)
クイナ科 L=39cm



ツグミ(鶉) ヒタキ科 L=24

A small bird, likely a species of sparrow or finch, is perched in a field of dry, golden-brown grass. The bird has a reddish-brown head and neck, a greyish-brown back, and a breast with prominent brown spots. It is facing left. The background is a dense field of similar dry grass, slightly out of focus.

ハチジョウツゲミ(八丈鶉)
ヒタキ科 L=24cm




ハチジョウツグミ(八丈鶇)
ヒタキ科 L=24cm

ツグミ(鶇)
ヒタキ科 L=24cm

A bird with brown and grey mottled plumage is standing in a field of dry, yellowish-brown grass. The bird is facing right and has a small, dark beak. Its body is covered in a pattern of brown spots and streaks on a greyish-brown background. The background is a dense thicket of dry grass, creating a textured and somewhat chaotic environment. The lighting is natural, suggesting an outdoor setting during the day.

ハチジョウツグミ(八丈鶉)
ヒタキ科 L=24cm



ハチジョウツグミ(八丈鶇)
ヒタキ科 L=24cm



コガモ(小鴨)オス
ガンカモ科 L=38cm







メス

オス

コガモ(小鴨) ガンカモ科 L=38cm



コガモ(小鴨)メス
ガンカモ科 L=38cm



コブハクチョウ(瘤白鳥) ガンカモ科 L=152cm



コブハクチョウ(瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm

A white swan with a black patch on its face is swimming in dark water. The swan is facing left, and its long neck is extended. The water is dark and has small ripples. The swan's feathers are white and appear slightly damp.

コブハクチョウ(瘤白鳥)
ガンカモ科 L=152cm



オス



メス

ヨシガモ(葦鴨)
ガンカモ科 L=48cm

END