


2018.11.03

福岡市西区・今津干潟のクロツラヘラサギ、ヘラサギ、チョウゲンボウ





コサギ (小鷺)
サギ科 L=61cm

クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77cm



ダイサギ(大鷺) サギ科 L=90cm



オナガガモ (尾長鴨)
ガンカモ科 L=メス53cm

マガモ (真鴨) オス
ガンカモ科 L=59cm



オナガガモ (尾長鴨)
ガンカモ科 L=メス53cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



ヘラサギ (篋鷺) トキ科 L=86cm



ヘラサギ (篋鷺)
トキ科 L=86cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm

ゴサギ (小鷺)
サギ科 L=61cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77cm



ヘラサギ (篋鷺) トキ科 L=86cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77cm



オナガガモ (尾長鴨)
ガンカモ科 L=オス75cm



マガモ (真鴨)
ガンカモ科 L=59cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス33cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス33cm



モズ (百舌) オス
モズ科 L=18cm



タゲリ (田鳧) チドリ科 L=32cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77cm

A white bird, likely a species of egret or heron, is captured in profile, walking through shallow, rippling water. The bird has a long, dark, slightly curved beak and black legs. Its body is mostly white, with some darker feathers on its wings. The background shows a dark, muddy shoreline and the water's surface with gentle ripples.

クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス 33cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス 33cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス33cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス33cm

カササギ (鶺鴒)
カラス科 L=45cm



二つ目?の
ヒドリガモ (緋鳥鴨) メス
ガンカモ科 L=49cm



マガモ (真鴨) オス
ガンカモ科 L=59cm



オナガガモ (尾長鴨) ガンカモ科 L=メス53cm



A group of mallards swimming in a body of water. The ducks are scattered across the frame, with some in the foreground and others further back. The water is a deep blue-grey color with gentle ripples. The ducks have characteristic green heads, yellow bills, and grey-brown bodies with white underparts. One duck in the upper right is a female mallard with mottled brown and white feathers.

マガモ (真鴨)
ガンカモ科 L=59cm



グイサギ (大鷺) サギ科 L=90cm



アオアシギ (蒼脚鶴) シギ科 L=35cm



カルガモ (軽鴨)
ガンカモ科 L=61cm




カルガモ (軽鴨) ガンカモ科 L=61cm



オナガガモ (尾長鴨) ガンカモ科 L=オス75cm



ダイサギ (大鷺) サギ科 L=90cm



ホオジロ (頬白)
ホオジロ科 L=16cm



ハマシギ (滨鹬) シギ科 L=21cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77cm

END