

2018.12.31

福岡市西区・今津干潟のアトリ、カワラヒワ、チョウゲンボウ、ハヤブサ



アトリ(花鶏) オス
アトリ科 L=16cm




カワラヒワ (河原鶺)
アトリ科 L=14.5cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス33cm



ハヤブサ (隼)
ハヤブサ科





アオアシシギ (蒼脚鷗)
シギ科 L=35cm



ハマシギ (浜鷗)
シギ科 L=21cm




アオアシシギ (蒼脚鶺)
シギ科 L=35cm



タシギ (田鷓)
シギ科 L=26cm

A photograph of two ducks swimming in a pond. The ducks have white bodies with black and reddish-brown markings on their wings and heads. The duck on the right has a prominent red beak. They are swimming in front of a dense thicket of tall, dry reeds. The water is dark blue with some ripples.

ツクシガモ (筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm



ツクシガモ (筑紫鴨)

ガンカモ科 L=63cm

ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm





チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス33cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス33cm

カワラヒワ (河原鶉), オス
アトリ科 L=14.5cm



メス

アトリ (花鶉)
アトリ科 L=16cm



オス



アトリ (花鶉) オス
アトリ科 L=16cm



アトリ (花鶉) オス
アトリ科 L=16cm



カワラヒワ (河原鶇)
アトリ科 L=14.5 c m



カワラヒワ (河原鶇)
アトリ科 L=14.5 c m

A long, thin wire extends diagonally from the top-left towards the bottom-right of the frame. It is densely populated with small, brown birds, likely sparrows, perched in a single file. The background is a uniform, clear blue sky. The birds are small and their features are somewhat indistinct due to the distance and the angle of the shot.

アトリ(花鶏) アトリ科 L=16cm
カワラヒワ(河原鶉) アトリ科 L=14.5cm



カイツブリ (鳩)
カイツブリ科 L=26cm

A photograph showing four grebes swimming in a body of blue water. The grebes are small, dark-colored birds with lighter patches on their backs. They are arranged in a loose group, with one on the left, two in the center, and one on the right. The water has a textured, wavy surface.

カイツブリ (鴉) カイツブリ科 L=26cm

A photograph of two ducks swimming in a pond. The ducks have dark green heads, red bills, and white bodies with black and brown patches on their wings and backs. They are swimming towards the left. In the background, there is a dense thicket of tall, dry reeds. The water is a deep blue color with some ripples.

ツクシガモ (筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm




ミサゴ (鶞)
ワシタカ科 L=メス64cm



ミサゴ (鵟)
ワシタカ科 L=メス64cm



ヘラサギ (篋鷺)
トキ科 L=86cm



ヘラサギ (篋鷺)
トキ科 L=86cm



クロツラヘラサギ
(黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



ハマシギ (滨鹬) シギ科 L=21cm



ヘラサギ (鳧鷖) トキ科 L=86cm



ハマシギ (滨鹬) シギ科 L=21cm



カルガモ (軽鴨)
ガンカモ科 L=61cm

A group of Hamashigi (滨鹬) birds are shown foraging in shallow, rippling blue water on a dark, rocky beach. The birds have brown upperparts and white underparts, with long, thin bills. They are scattered across the water, some standing and others with their heads down. The background shows the dark, pebbly shore under bright sunlight.

ハマシギ (浜鹬) シギ科 L=21cm

クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm






クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ（黒面篋鷺）
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77 cm
ヘラサギ (篋鷺) トキ科 L=86cm



マガモ (真鴨) オス ガンカモ科 L=59cm



ハヤブサ (隼) ハヤブサ科



ハヤブサ (隼) ハヤブサ科



ハヤブサ (隼) ハヤブサ科



ハヤブサ (隼)
ハヤブサ科

A black swan with a white patch on its forehead is swimming in a pond. The water is dark and reflects the surrounding reeds. The background is filled with tall, dry reeds.

オオバン (大鵞) クイナ科 L=39cm

A female Gadwall duck is shown swimming in a body of water. The duck has mottled brown and grey feathers and a dark, slightly hooked bill. It is captured in profile, moving from left to right. The water is rippled, and the background is a soft-focus expanse of water.

コガモ (小鴨) メス
ガンカモ科 L=38cm



ツクシガモ (筑紫鴨) ガンカモ科 L=63cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス 33cm

チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス33cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス33cm



チョウゲンボウ (長元坊)
ハヤブサ科 L=オス 33 cm



可也山 (かやさん) 365m

12:09

END