


2020.04.22

福岡市西区・今津干潟の

スズガモ、セイタカシギ、クロツラヘラサギ、ソリハシシギ



15:40 毘沙門山（びしゃもんやま）177m



15:45 今山81m



スズガモ(鈴鴨)ガンカモ科 L=オス47cm



セイタカシギ(丈高鷺)メス  
セイタカシギ科 L=32cm



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺)  
トキ科 L=77cm



ソリハシシギ(反嘴鷺)  
シギ科 L=23cm



スズガモ(鈴鴨)ガンカモ科 L=オス47cm



セイタカシギ (丈高鷺) メス  
セイタカシギ科 L=32cm



セイタカシギ (丈高鷺) メス  
セイタカシギ科 L=32cm

A Black-faced Stilt (クロツラヘラサギ) is shown standing in shallow, rippling water. The bird has white plumage on its body and neck, with a distinctive black face and a long, black, patterned beak. It is holding a small piece of wood or debris in its beak. The water is a mix of blue and brown tones, suggesting a natural, possibly coastal or estuarine, environment. The lighting is bright, highlighting the bird's features.

クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺) トキ科 L=77cm



アオアシシギ（蒼脚鷗）  
シギ科 L=35cm



キアシシギ (黄足鵜)  
シギ科 L=25 c m



キアシシギ (黄足鷸)  
シギ科 L=25cm



ハマシギ(浜鷸) シギ科 L=21cm



ソリハシシギ (反嘴鷸)  
シギ科 L=23cm





ソリハシシギ (反嘴鷗) シギ科 L = 23 c m



ソリハシシギ (反嘴鶴)  
シギ科 L=23cm



ホオジロ（頬白）  
ホオジロ科 L=16cm




セイタカシギ（丈高鶴）メス  
セイタカシギ科 L=32cm



ソリハシシギ (反嘴鵜) シギ科 L=23 c m



セイタカシギ (丈高鷗) メス  
セイタカシギ科 L=32cm




ハマシギ (濱鷗)  
シギ科 L=21 c m



クロツラヘラサギ (黒面篋鷺)  
トキ科 L=77cm



A photograph of three shorebirds on a beach. The birds have brown and white mottled plumage and long, thin bills. They are standing on a dark, pebbly shore with waves breaking in the background. One bird is on the left, one in the center, and one on the right. The bird on the right is standing on a rock covered in seaweed.

キアシシギ (黄足鷗)  
シギ科 L=25 c m

ハマシギ (浜鷗)  
シギ科 L=21 c m

END