

2020.04.29

福岡市西区・今津干潟の

チュウシャクシギ、キアシシギ、コチドリ、タシギ



A shorebird with a long, dark, downward-curved beak stands in shallow, rippling water. The bird has mottled brown and grey plumage on its back and wings, and a lighter, speckled breast. The background shows a muddy or sandy shore with patches of green algae or moss.

チュウシャクシギ(中杓鷗)シギ科 L=42 c m



キアシシギ (黄足鷸)
シギ科 L=25cm



キアシシギ (黄足鷗)
シギ科 L=25cm



キアシシギ (黄足鷗) シギ科 L=25cm



コチドリ (小千鳥) チドリ科 L=16cm



ダイサギ (大鷺)
サギ科 L=90cm



アオサギ (蒼鷺)
サギ科 L=93cm



コゲラ (小啄木鳥)
キツツキ科 L=15cm



チュウシャクシギ(中杓鷗)シギ科 L=42 c m



チュウシャクシギ(中杓鷗)
シギ科 L=42cm



チュウシャクシギ(中杓鷗) シギ科 L=42 c m



ダイサギ (大鷺) サギ科 L=90cm



チュウシャクシギ(中杓鷗) シギ科 L=42 c m



チュウシャクシギ(中杓鷗)
シギ科 L=42cm

A woodcock (タシギ) is shown in profile, standing in shallow, rippling water. It has a long, straight, dark beak that is partially submerged. The bird's plumage is mottled with brown, black, and white spots, providing camouflage. Its reflection is visible in the water below. The background is a soft, out-of-focus blue sky.

タシギ (田鷸) シギ科 L=26cm



タシギ (田鵜) シギ科 L=26cm



コチドリ (小千鳥)
チドリ科 L=16cm



コチドリ (小千鳥)
チドリ科 L=16cm

END