

2020.12.20

福岡市西区・今津干潟の

ヨシガモ、ヒクイナ、タゲリ、チョウゲンボウ、クロツラヘラサギ



ヨシガモ(葦鴨)オス ガンカモ科 L=48cm



ヒクイナ(緋秧鶏)
クイナ科 L=23cm



クロツラヘラサギ(黒面琵鷺)
トキ科 L=77cm



タゲリ(田鳧)
チドリ科 L=32cm



チョウゲンボウ(長元坊)
ハヤブサ科 L=メス39cm



ヨシガモ(葦鴨)オス
ガンカモ科 L=48cm

メス=48cm

オス=54cm

ヨシガモ（葦鴨） ガンカモ科



ヨシガモ(葦鴨) ガンカモ科 L=メス48cm



オオバン(大鵞)
クイナ科 L=39cm



ヨシガモ(葦鴨) ガンカモ科 L=メス48cm



アオアシシギ(蒼脚鵞)
シギ科 L=35cm



ヒクイナ (緋秧鶏) クイナ科 L=23cm



ヒクイナ(緋秧鶏)
クイナ科 L=23cm



ヒクイナ(緋秧鶏)
クイナ科 L=23cm



ヒクイナ(緋秧鶏)
クイナ科 L=23cm



タゲリ (田鳥)
チドリ科 L=32cm



タゲリ (田鳥) チドリ科 L=32cm



タゲリ (田鳥) チドリ科 L=32cm



モズ (百舌)オス
モズ科 L=18cm



カンムリカイツブリ (冠鳩) カイツブリ科 L=56cm



チョウゲンボウ(長元坊)
ハヤブサ科 L=メス39cm



チョウゲンボウ(長元坊)
ハヤブサ科 L=メス39cm



チョウゲンボウ(長元坊)
ハヤブサ科 L=メス39cm

A group of approximately 15 Hamashigi (滨鹬) birds are scattered across a shallow, rocky tidal pool. The water is clear and blue, reflecting the sky. The rocks are dark and wet, creating a textured ground for the birds. The birds have a mottled pattern of brown and white on their backs and wings, with a lighter underbelly. They are mostly facing downwards, likely foraging for food. The overall scene is peaceful and natural.

ハマシギ(滨鹬) シギ科 L=21cm



ハマシギ(浜鷗) シギ科 L=21cm



ハマシギ(浜鷗) シギ科 L=21cm



ハマシギ(浜鷗)
シギ科 L=21cm



ハマシギ(浜鷗) シギ科 L=21cm



ダイサギ(大鷺)
サギ科 L=90cm



ダイサギ(大鷺)
サギ科 L=90cm



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺)
トキ科 L=77cm

可也山(かやさん)365m

2020/12/20
9:25

END