

2021.04.24

福岡市西区・今津干潟の
ツクシガモ、
ハウロクシギ、
ハシビロガモ、 ヨシガモ



ハシビロガモ(嘴広鴨)オス ガンカモ科 L=50cm



ツクシガモ(筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm

ハウロクシギ(焙烙鵞)
シギ科 L=63cm



マガモ(真鴨)オス
ガンカモ科 L=59cm

ヨシガモ(葦鴨)
ガンカモ科 L=オス54cm

ツクシガモ(筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm



チュウシャクシギ(中杓鷗)
シギ科 L=42cm

ツクシガモ(筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm

ハウロクシギ(焙烙鷗)
シギ科 L=63cm



ハウロクシギ(焙烙鷗)
シギ科 L=63cm

チュウシャクシギ(中杓鷗)
シギ科 L=42cm



ハウロクシギ(焙烙鷗)
シギ科 L=63cm



ツクシガモ(筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm

ハウロクシギ(焙烙鷗)
シギ科 L=63cm



ハウロクシギ(焙烙鵜) シギ科 L=63cm



ハウロクシギ(焙烙鵜) シギ科 L=63cm



ツクシガモ(筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm

ハウロクシギ(焙烙鵜)
シギ科 L=63cm



ハウロクシギ(焙烙鵜) シギ科 L=63cm



ツクシガモ (筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm

ハウロクシギ (焙烙鷸)
シギ科 L=63cm



ハウロクシギ(焙烙鷸)
シギ科 L=63cm



ツクシガモ(筑紫鴨) ガンカモ科 L=63cm



ツクシガモ(筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm



ホウロクシギ(焙烙鶺鴒)
シギ科 L=63cm

A group of ducks and curlews are gathered on a rocky shore. On the left, there are five ducks with white bodies, dark heads, and reddish-brown wing patches. On the right, there are several curlews with long, thin, downward-curved bills and mottled brown and white feathers. One curlew in the center-right is spreading its wings. The background shows a body of water with gentle ripples.

ツクシガモ(筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm

ハウロクシギ(焙烙鷗)
シギ科 L=63cm



ツクシガモ(筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm



ツクシガモ(筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm

ハウロクシギ(焙烙鶺鴒)
シギ科 L=63cm



ハシビロガモ(嘴広鴨)オス
ガンカモ科 L=50cm




オオバン(大鵞) クイナ科 L=39cm

ヨシガモ(葦鴨)
ガンカモ科 L=オス54cm

マガモ(真鴨)オス
ガンカモ科 L=59cm

ツクシガモ(筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm



ヨシガモ(葦鴨)
ガンカモ科 L=オス54cm

ツクシガモ(筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm



ヨシガモ(葦鴨)
ガンカモ科 L=オス54cm



ツクシガモ(筑紫鴨)
ガンカモ科 L=63cm



カルガモ(軽鴨)
ガンカモ科 L=61cm



オナガガモ(尾長鴨)
ガンカモ科 L=オス75cm