

2021.05.21

福岡市西区・今津干潟の

キアシシギ、キンクロハジロ、ハマシギ、クロツラヘラサギ



キアシシギ(黄足鷗)
シギ科 L=25cm



ハマシギ(浜鷗) シギ科 L=21cm



キンクロハジロ(金黒羽白) ガンカモ科 L=オス40cm



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺) トキ科 L=77cm



キアシシギ(黄足鷗)
シギ科 L=25cm



キアシシギ(黄足鷗)
シギ科 L=25cm



キアシシギ(黄足鷗)
シギ科 L=25cm



キアシシギ(黄足鷗)
シギ科 L=25cm



キアシシギ(黄足鷗)
シギ科 L=25cm



キアシシギ(黄足鷗)
シギ科 L=25cm



キンクロハジロ(金黒羽白) ガンカモ科 L=オス40cm



カルガモ(軽鴨)
ガンカモ科 L=61cm



マガモ(真鴨) オス
ガンカモ科 L=59cm



ハンビロガモ(嘴広鴨)オス
ガンカモ科 L=50cm



ヒドリガモ(緋鳥鴨) オス
ガンカモ科 L=49cm



キアシシギ(黄足鷗)
シギ科 L=25cm



キアシシギ(黄足鷗) シギ科 L=25cm



キアシシギ(黄足鷗) シギ科 L=25cm



キアシシギ(黄足鷗) シギ科 L=25cm



ハマシギ(浜鷗)
シギ科 L=21cm



ハマシギ(浜鷗) シギ科 L=21cm



ハマシギ(浜鷗) シギ科 L=21cm



ハマシギ(浜鷗) シギ科 L=21cm



ハマシギ(浜鹬) シギ科 L=21cm

A group of approximately 15 Hamashigi (滨鹬) birds are scattered across several small, moss-covered rocks in shallow, rippling water. The birds have mottled brown and white plumage and long, thin legs. The water is a deep blue-grey color, and the moss on the rocks is a vibrant green. The background shows more rocks and water extending to the horizon.

ハマシギ(浜鹬) シギ科 L=21cm



クロツラヘラサギ(黒面篋鷺) トキ科 L=77cm

END